

Esthetic Guide

ОБЛИК

Тело. Формы и контур



1 (45) 2022



9 7724 12 493008




MEDEX^{MD}
peptide & cell technology

Филлеры SkinPlus-Hyal

**МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ РЕСТАВРАЦИИ ЛИЦА**

MCL – технология многоуровневого
перекрёстного сшивания гиалуроновой кислоты



**11 препаратов SkinPlus-Hyal решают весь спектр
эстетических проблем**

Регистрационное удостоверение № P3H 2016/4999 от 11.11.2016 года

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ — ООО «Медекс»

+7 (499) 519-01-21

www.medexportal.ru www.skinplushyal.ru

Омоложение деликатных зон

Комплексный подход к коррекции признаков фото- и хроностарения деликатных зон: шеи, декольте, тыльной поверхности кистей рук — с использованием препаратов SkinPlus-Hyal 70* Soft и SkinPlus-Hyal 60* Soft.



Дмитрий Урман

врач-дерматокосметолог,
Москва

@dr_urman

Введение

Признаки увядания дермы в областях шеи и декольте становятся заметными после 30 лет. Появляются горизонтальные складки на коже — вследствие двигательной активности шейного отдела позвоночника, вертикальные морщины, связанные с общим снижением тургора кожи, а также пигментные пятна. Это связано с морфофункциональными особенностями строения данных зон, ведь толщина кожного покрова здесь небольшая, а подкожно-жировой слой практически отсутствует.

Также из-за постоянного воздействия внешних неблагоприятных факторов и патогенетического старения отдельного внимания требует кожа тыльной поверхности кистей рук. С возрастом в этой области появляются пигментные пятна, кожа становится морщинистой, вены и сухожилия начинают контурироваться.

Клинический случай

Пациент — женщина, 60 лет. Соматически здорова. Эндокринологический статус — без особенностей. Аллергоанамнез — неотягощён. Нормостеник. Усталый морфотип с прогностической трансформацией в мелкоморщинисто-деформационный. Конституциональный тип кожи лица, шеи и декольте: себорефидицидная, дегидратированная, тонкая, тургор и эластичность снижены. Подкожно-жировая клетчатка выражена умеренно. Кожа тыльной поверхности кистей рук дегидратированная, наблюдаются проявления скелетизации, подкожно-жировая клетчатка выражена слабо.

Предложена комплексная эстетическая коррекция проявленных признаков старения с терапевтическим эффектом омоложения.



Цель и задачи коррекции

Цель: восполнить объём проявленных дермальных морщин на коже, восстановить гидробаланс, стимулировать обновление коллаген-эластиновых структур матрикса, усилить внутреннюю иммунную систему кожи, подавить выраженность гиперпигментации.

Задачи:

- биостимуляция дермального матрикса кожи, восстановление гидратации, повышение защитно-барьерных свойств, уменьшение выраженности горизонтальных морщин колец Венеры в области шеи,
- уплотнение и глубокое увлажнение кожи, камуфлирование линейно-дермальных заломов и проявленной атоничности с элементами возрастной гиперпигментации в области декольте,
- восстановление утраченного объёма и тонуса кожи тыльной поверхности кистей рук,
- восполнение объёма мягких тканей, стимуляция регенерации механизмов стареющей кожи.

Выбор препарата

Для работы в зоне шеи и декольте выбран биоревитализант пролонгированного действия со специфическими качествами скин-бустера — SkinPlus-Hyal 60* Soft. Препарат создан на основе высокомолекулярной нестабилизированной ГК (вес молекулы — 1,8 млн Да, концентрация — 20 мг/мл), полученной методом ферментативной очистки из сенной палочки *Bacillus subtilis* (Shiseido Company, Limited) и практически не вызывающей иммунного отклика организма. Способность к пролонгированной биодеградации стимулирует процесс неоколлагенеза. Препарат восполняет водный баланс, разглаживает дермальные морщины, камуфлирует гиперпигментацию.

В тыльную поверхность кистей рук будет введён филлер SkinPlus-Hyal 70* Soft. Помимо восполнения объёма мягких тканей, он восстанавливает регенеративные механизмы стареющей кожи.



Протокол процедуры

1. Сбор анамнеза, оформление добровольного информированного согласия на проведение процедуры и фотодокументирование.
2. Очистение, антисептическая обработка и обезболивание (зона шеи и декольте).
3. Введение SkinPlus-Hyal 60* Soft и SkinPlus-Hyal 70* Soft.
4. С целью сокращения длительности процедуры во время экспозиции анестезии в зонах шеи и декольте корректируем кожу тыльной поверхности кистей рук.

Коррекция кожи кистей рук

Филлер SkinPlus-Hyal 70* Soft вводится канюлей 22G x 50/70 мм в основном между сухожилиями. Критерий правильной глубины: при оттягивании канюли наблюдается её контур. Производятся две точки вкола при помощи троакарной иглы:

- проксимальная (первая) — в области запястья, препарат распределяем от дистальных отделов тыльной части кисти к проксимальным.
- С точки вкола канюля вводится на всю длину, экструзия выполняется ретроградной техникой в двух векторах по 0,2 мл,
- дистальная (вторая) — в области межпальцевых промежутков, препарат распределяется от проксимальных отделов тыльной части кисти к дистальным. С точки вкола канюля вводится на всю длину, экструзия выполняется ретроградной техникой в трёх векторах по 0,2 мл.

Для процедуры понадобится один шприц SkinPlus-Hyal 70* Soft объемом 2 мл, по 1 мл на каждую зону. После процедуры на кожу наносим регенерирующий rHormula P.O.S.T. Recovery Cream.

Коррекция зон шеи и декольте

Очищаем кожу от анестезирующего крема, проводим трёхуровневую процедуру асептики и антисептики раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 %.

Инъекции осуществляем в области дермального залама впаоль линий горизонтальной морщины в направлении латерального отдела шеи от медиальной линии симметрии.

Процедура потребует 1–2 мл препарата (один шприц — 2,2 мл). Методом поверхностного подкожного армирования короткими линиями иглой 30G x 13 мм осуществляем инъекции SkinPlus-Hyal 60* Soft по массажным линиям, от центра к периферии, с расхождением между линиями 10–15 мм, в технике ретроградного введения препарата step by step. Далее — постпроцедурная обработка кожи и мягкий моделирующий массаж с использованием rHormula P.O.S.T. Recovery Cream.

Продолжительность процедуры — 60–80 минут. Курс — две процедуры, рекомендуется повторить через 30–45 календарных дней. Продолжительность результата — 10–12 месяцев. ●



Рекомендация для пациентов, принимающих антиагреганты: приостановить их приём за 4–5 дней до процедуры для снижения риска появления гематом.



До

Сразу после

ВюPlus Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор в РФ — ООО «Медэкс», medexportal.ru, [@skinplus_hyal](https://www.instagram.com/skinplus_hyal)